Профилактика «Крымской геморрагической лихорадки»

Очень опасное заразное вирусное заболевание, передающееся человеку через укус зараженного клеща или мокреца, а так же при снятии и раздавливании клеща на коже человека или при уходе за больным человеком.

Носителями вируса и его переносчиками являются клещи, мокрицы, мышевидные грызуны. Клещи могут нападать на человека при уходе за домашними животными, при отдыхе на реке, в лесополосе, на дачных участках.

Инкубационный период 7-10 дней, заболевание начинается остро- с повышения температуры до 39-40 градусов, с ознобом, сильной головной болью, болью в пояснице, иногда отмечается рвота. Со 2-3 дня болезни появляется резкое покраснение кожи лица, шеи, верхней части груди и слизистых глаз. На коже боковых поверхностей груди, живота появляется выпь, возникают кровотечения: маточные, желудочные, носовые ,из десен и « синяки» на месте введения лекарственных препаратов, появляется желтушное окрашивание кожи.

Больные с подозрением на заболевание Крымской геморрагической лихорадкой подлежат обязательной госпитализации в инфекционное отделение.

В целях недопущения заражения Крымской геморрагической лихорадкой необходимо соблюдать меры предосторожности:

- -при полевых работах, уходе за скотом использовать защитную спецодежду предохраняющую от заползания клещей на тело;
- -при отдыхе на природе- использование репеллентов отпугивающих клещей «Байгон» , « Дета»;
- -осмотр домашних животных, снятие, не раздавливая клещей;
- -снятых клещей необходимо сжечь;
- -лужайки для отдыха на природе выбирать в дали стогов и кустарников, нельзя садится на пни, ложится на траву, валежник;
- -осматривать букеты, принесенные из рощи;
- -обезвредить от грызунов служебные помещения и жилье.

Если Вас укусил клещ и появилось повышение температуры, озноб, сильная головная боль, боль в пояснице не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу, выполнение этих несложных мер предосторожности позволит предупредить опасное для жизни заболевание.